

29.05.2019

sFlt-1 / PIGF-Quotient: Biomarker zur Diagnose und Vorhersage einer Präeklampsie ab SSW 20

Sehr geehrte Frau Kollegin,
sehr geehrter Herr Kollege,

ab dem 3. Juni 2019 können wir Ihnen die Bestimmung des sFlt-1/PIGF-Quotienten zur Diagnose und Vorhersage der Präeklampsie als selbst erbrachte Untersuchung in unserem Haus anbieten.

Bei Frauen mit Präeklampsie werden erniedrigte PIGF- und erhöhte sFlt-1-Werte gemessen, so dass die Berechnung des Quotienten aus sFlt-1 und PIGF ab der Schwangerschaftswoche 20+0 eine zuverlässige Differenzierung von Schwangerschaften mit bzw. ohne Präeklampsie erlaubt.

Die Untersuchung ist verfügbar von montags bis freitags. Am Samstag eingesandte Proben werden am darauffolgenden Werktag analysiert. Proben, welche bis 16:30 Uhr im Labor eintreffen, werden noch tagesgleich gemessen und medizinisch befundet. Als Probenmaterial senden Sie bitte Serum ein, welches gekühlt (2-8°C) bis zu 48 Stunden stabil ist. Die aktuellen Cut-Offs zur Vorhersage in Abhängigkeit der Gestationsphase entnehmen Sie bitte unserem Befund oder den Angaben auf unserer Homepage.

Die Bestimmung des sFlt-1/PIGF-Quotienten stellt keine Kassenleistung dar. Der Preis für selbstzahlende Kassenpatienten beträgt 87,44 Euro sowie 100,56 Euro (1,15fach) für Privatpatienten.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Ansprechpartner

Dr. rer. nat. Falko Wünsche Tel. 0231 9572 6657

Mit kollegialen Grüßen,



Dr. med. Bettina Eberhard